

Sito No3
✓



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Ufficio I

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado
SEDE

Ai Coordinatori delle attività educative e
didattiche
di ogni ordine e grado
SEDE

e, p.c., Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
USR Puglia
SEDE

Ai Dirigenti Tecnici - USR Puglia - SEDE

Al Sito WEB - USR Puglia

ISTITUTO COMPRENSIVO "DANTE - GALIANI" 71013 SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)		
23 APR. 2021		
Prot. N.	1406	
TIT.	A CL. 53	FASC.

Oggetto: parere della CTS di AIFA – Vaccinazione anti SARS-CoV2/COVID-19. Estensione dell'intervallo tra le due dosi dei vaccini a mRNA.

Si trasmette alle SS.LL. per opportuna conoscenza la nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio IV Personale docente ed educativo prot DGPER n. 12424 del 22/04/2021, l'unità circolare del Ministero della Salute acquisita con prot. n. REGISTRO_UFFICIALE_I_0015166.12-04-2021 concernente l'oggetto corredata del relativo allegato.

Si prega di voler dare massima diffusione agli allegati documenti.

Allegati:

m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.I.00012424.22-04-2021

REGISTRO_UFFICIALE_I_0015166.12-04-2021

Allegato1_parere

IL DIRIGENTE
Mario TRIFILETTI



Firmato digitalmente da
TRIFILETTI MARIO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Referente Regionale Promozione alla Salute: dott.ssa Valentina ROMANAZZI valentina.romanazzi@posta.istruzione.it

Via S. Castromediano,123 – 70126 – BARI

web: www.pugliausr.gov.it – E-mail: direzione-puglia@istruzione.it – PEC: drpu@postacert.istruzione.it



Roma, 09 aprile 2021

OGGETTO: PARERE CTS ESTENSIONE DELL'INTERVALLO TRA LE DUE DOSI DEI VACCINI A mRNA

PARERE CTS: Valutata la richiesta pervenuta dal Commissario Straordinario per l'emergenza COVID-19 in merito alla possibilità di estendere l'intervallo temporale tra la prima e la seconda somministrazione dei vaccini a mRNA, la CTS ribadisce che l'intervallo ottimale tra le dosi è, rispettivamente, di 21 giorni per il vaccino Comirnaty e di 28 giorni per il Vaccino COVID-19 Moderna (come indicato nei rispettivi RCP). Qualora tuttavia si rendesse necessario dilazionare di alcuni giorni la seconda dose, la Commissione precisa che, in accordo con quanto scritto in RCP e con quanto già dichiarato dal WHO, non è possibile superare in ogni caso l'intervallo di 42 giorni per entrambi i vaccini a mRNA. Si ribadisce che per ottenere una protezione ottimale è necessario completare il ciclo di vaccinazione con la seconda dose.